

Circoncisione

Guida per i genitori



I genitori di neonati maschi possono prendere in considerazione la possibilità di sottoporre il proprio figlio a circoncisione. Negli Stati Uniti, non esistono leggi o regole particolari al riguardo, è quindi una scelta del tutto individuale. Prima di prendere una decisione, i genitori dovrebbero informarsi sulla procedura e consultare un medico.

Che cos'è la circoncisione?

I neonati di sesso maschile presentano un lembo di pelle che ricopre la parte superiore del pene, chiamato prepuzio. La circoncisione è una procedura chirurgica per asportare il prepuzio. Viene spesso eseguita durante i primi 10 giorni di vita del bambino.

La durata dell'intervento è di circa 5-10 minuti. Durante la circoncisione, pene e prepuzio vengono disinfettati e il prepuzio viene rimosso. Per aiutare a ridurre qualsiasi disagio durante la procedura, e per diverse ore dopo di essa, i genitori decideranno insieme al medico cosa utilizzare per alleviare il dolore del bambino. In preparazione all'intervento, è possibile applicare una crema anestetizzante topica sul pene o iniettare un anestetico per rendere l'area insensibile. A volte, insieme all'anestetico, viene somministrato del paracetamolo.

Che cosa succede dopo la circoncisione?

Dopo l'intervento è fondamentale mantenere la zona il più pulita possibile sostituendo la fasciatura ad ogni cambio di pannolino. Applicare della crema sulla garza per evitare che la medicazione si attacchi. Se si utilizza un anello di plastica al posto della medicazione, esso cade spontaneamente dopo 5-8 giorni.

In circa 7-10 giorni, il pene dovrebbe essere completamente guarito. È normale che la punta del pene sia arrossata e che presenti una piccola quantità di fluido giallo. Utilizzare acqua calda per mantenere pulita l'area circonscisa. In alternativa, è possibile utilizzare un sapone delicato, ma vanno evitate le salviette umidificate.

Quali sono i rischi?

Nel prendere una decisione sulla circoncisione, è necessario considerarne anche i rischi. Le complicanze sono rare e in ogni caso facili da trattare. Può verificarsi un lieve sanguinamento che non richiede particolari interventi. In presenza di una storia familiare per disturbi della coagulazione, occorre informare il proprio medico. La circoncisione potrebbe causare dolore o disagio, in questo caso il medico indicherà la giusta terapia.

In rari casi, il bambino potrebbe sviluppare un'infezione al pene. Tra i segni di infezione vi sono rossore o gonfiore persistenti, eventualmente accompagnati da febbre. Se questo accade, è importante consultare subito un medico in modo da intervenire tempestivamente.

Quali sono i benefici?

La circoncisione può comportare diversi vantaggi. Per gli uomini circoncisi è più semplice mantenere un adeguato livello di igiene, ma i non circoncisi possono comunque imparare a lavare con cura la zona sotto il prepuzio.

La circoncisione può anche ridurre lievemente il rischio di infezioni alle vie urinarie (IVU) e di alcune malattie a trasmissione sessuale. I disturbi penieni, come il dolore, il gonfiore e le infezioni, sono più comuni negli uomini non circoncisi.



Circoncisione

Guida per i genitori

La circoncisione negli adolescenti e negli adulti

La procedura è la stessa a qualsiasi età, ma negli adulti può richiedere l'anestesia generale. I tempi di guarigione possono essere più lunghi e il rischio di complicazioni più elevato.

La scelta

Sono i genitori a decidere se sottoporre il proprio figlio a circoncisione. È importante rivolgersi al proprio medico per chiarire qualsiasi dubbio prima della nascita del bambino, al fine di avere il tempo necessario per prendere una decisione ponderata.

Informazioni sulla Fondazione per la cura urologica

La Fondazione per la cura urologica è la principale fondazione urologica al mondo e la fondazione ufficiale dell'American Urological Association. Condividiamo informazioni sulla salute urologica per sostenere le persone che desiderano rendere più sana la loro vita. Le nostre informazioni sono basate sulle risorse dell'American Urological Association e sono revisionate da medici specializzati. Per saperne di più, visita il sito web della Fondazione per la cura urologica, UrologyHealth.org/UrologicConditions o vai su UrologyHealth.org/FindAUrologist per trovare il medico più vicino a te.

Disclaimer

Queste informazioni non rappresentano uno strumento di autodiagnosi e non sostituiscono la consulenza di un medico specializzato. Rivolgersi al proprio medico o al proprio urologo per qualsiasi problema di salute.

Chiedere sempre un consulto al proprio medico prima di iniziare o interrompere qualsiasi trattamento, compresi quelli farmacologici. Per altre condizioni urologiche, visitare il sito UrologyHealth.org/Download o chiamare il numero 800-828-7866.

Traduzione per gentile concessione di Società Italiana di Urologia

